


10

**DISSERTATIO**  
**INAUGURALIS MEDICA**  
**DE**  
**MORBIS FEMINARUM DIVERSIS**  
**QUAM**  
**CONSENSU ET AUCTORITATE**  
**MAGNIFICI DOMINI**  
**PRAESIDIS AC DIRECTORIS**  
**SPECTABILIS**  
**DOMINI DECANI**  
**AC**  
**CLARISSIMORUM D. D. PROFESSORUM**  
**PRO**  
**DOCTORIS MEDICINAE LAUREA**  
**SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS**  
**ET**  
**PRIVILEGIIS RITE OBTINENDIS**  
**IN**  
**ALMA AC CELEBERRIMA REGIA**  
**SCIENTIARUM UNIVERSITATE HUNGARICA**  
**PUBLICAE DISQUISITIONI**  
**SUBMITTIT**  
**ADALBERTUS DEUTSCH**  
**HUNGARUS N. KÖRÖSIENSIS.**

In theses adnexas disputabitur in palatio universitatis majore  
mensis                      die              1845.

---

**Pestini.**  
Typis Josephi Beime



Benedd multam — jelen 's jövőm  
Benedd van mindenem  
Oh, hon te vér szerezte kincs,  
Te drága gyöngy nekem!

Bajza.

A

**LEGBECSESEBB CSALÁDJÁNAK,**

**tisztelet és hála jeléül**

ajánlja

*a szerző.*



Mielőtt a nők betegségeit elősorolnám, szükségesnek látom, hogy a női életműség rendes állapotját, rendes működéseit röviden előadjam, s e szerint értekezésem két szakaszra fog oszlani, az első szakaszban a női egészséges alkatot, életműségének rendszerű folyamát adandom elő, párhuzamot vonva a nő és férfi között; a második szakaszban a női életműködések zavart állapotját, vagyis csupán a nőket megtámadni szokott betegségeket terjesztem elő.

## I. SZAKASZ.

### A nő, élettanilag véve.

Gyógyítanunk nem lehet betegségeket, ha az emberi életműséget rendszerű állapotjában nem esmerjük. Ezen élettani tulajdonok ösmérete a nőknél annyival inkább szükségessé válik, minthogy a nő és férfi alkat, a nő és férfi természet egymástól mind szellemi, mind természettani, vagyis anyagi viszonyaira nézve egymástól igen sokban különbözik.

#### A.

*A női egyéniség boncz- és élettani tekintetben.*

Nem czélom itt tökéletes boncztant, vagy élettant írni, hanem csupán a nő és férfi alkat, a nő és férfi életműködések közti különbséget kiemelni. Ezen különbség alapszik az életművek alakján, alkatán, nagyságán, azoknak különböző működésein.

A nő csontváza sokkal kellemesebb a férfiénál, nygy hogy az egésztest tekintve, a nők már e részben is megér-

demlik a szépnem nevezetét. A női csont fehérebb, rajta minden vonalok, minden hajlások finomabbak, eresztékei kisebbek s az összhangzást nem zavarók. A fő egykisé hátrább hajlott, kisebb, az arcz csontjai a koponya csontokhoz képest kisebbek, a koponya fenéke szűkebb, s így a halanték és áll-tájékok kissé összenyomottaknak látszanak; az edényeket és idegeket átbocsátó, vagy magokban tartó likak és csatornák szűkebbek. A mellkas felső része keskenyebb, mint az alsó, úgy hogy olly csűrök (comis) alakúnak tetszik, mellynek talapja lefelé, hegye pedig fölfelé van irányozva. A bordák sokkal vékonyabbak, finomabbak, rövidebbek és mozgékonyabbak, s ezen mozgékony-ság kipótolja a lélekzésben a mellkas szűk volta által okozott fogyatkozást. A gerincez oszlop csatornája, s az idegeket kibocsátó csigolya-lyukak nagyobb belvilággal bírnak. A medenczének minden átmérői nagyobbak, kivévén egyet; ennek szálagai és porcjai szélesebbek és erősebbek; a keresztcsont lapos, hátrahajlott, a farcsik csont mozgékonyabb s előre hajlo. A térdek csontizésülései vastagabbak; mind a fel-mind az alvégtagok vékonyabbak s általában finomabbak.

A mi az egész test alakját és alkatát illeti, legnagyobb különbséget szemlélünk a szülő részeken, ezekután jó az emlők kifejlődése stb.

A véredény-rendszer nem bir olly vastag, és erős edényekkel; de a függér lefelé igyeksző része, és a haszsigereket ellátó üterek belvilága nagyobb; az edények száma az alvégtagokban a has életműveiben és a szülő részékben olly nagy, hogy e részek a nőknél ez okból gyuladásra nagyon hajlandókká tétetnek. A vérnek nagyobb bősége irányoztatik a belrészekre, imen a bőr fehérebb, de annál nagyobb a vérfolyásokrai hajlam. A nyirk-edények és mirigyek sokkal inkább működnek az asszonynál. — Az agyvelő általában kicsinynek — de a többi életművekhez viszonyban nagyobbnak tetszik; de az agy idegei (nervi cerebrales) a szag- és lát ideget kivéve, vékonyabbak, kül



végpontjaik pedig vastagabbak; a medencze ideg fonatai a nemző részekhez menő idegekkel egyben jobban ki vannak fejlődve. — Az izmok vékonyabbak, az izomróstok nem olly merők, mint a férfnál. A sejtszövet puhább és nagyobb mennyiségű, innen van, hogy a nők tagai kerekdedebbek, és kövérebbek.

A mi illeti az erőnyi, vagy életműködési folyamat a nő nem bir olly erővel hatni vissza az ingerekre, de annál fogékonyabb az ingerekhez arányban. A nő hamarabb megbetegszik, de élet erői nagyobbak, s nyavalyájából könnyebben gyógyúl. Sokkal inkább ki vannak téve az ideges bántalmaknak, az izgékonytság, ingerlékenység nálok sokkal nagyobb fokon mutatkozik. A mélyebb gondolkozásra nem annyira alkalmasok, bár házi ügyeiket bölcsen tudják is kormányozni. A vérkeringés nálok sebesebb, mivel a tüdők szűkebbek, s a vér kevesebb mennyiségének élenyúlhetését a gyorsaság pótolja. Az áthasonlítás nőknél jobb, kevesebb étket is kívánnak. A bőr, gőzölgés bővebb a vizellet kevesebb, de töményebb. Szék- és vizellet kiürítéseiket tovább képesek eltartani.

A mi illeti a nemzés munkálatát, ez olly különös, hogy ennek előzményei, a serdülőkör előtünte, a havitisztulás beállása stb. valamint a fogamzás, szülés, szoptatás munkálatai külön köteteket kívánnának.

## B.

### *A női egyéniség szellemi tulajdonai.*

Már főlebb is említők, hogy a nő nem bir olly élés elmével, nem bir olly komoly olly mély belátással, mint a férfi, s innen származott azon magyarközmondás: „hosszu haj, rövid ész;“ de távol legyen, hogy ezt általánosan venném, sokkal jobban tisztelém a szépnemet, mint sem meg akarnám tőle tagadni a tiszta, okos, józan gondolkodás tehetségeit; nem, ezt általában róluk nem állithatjuk, mert a derék, tiszta gondolkodás, sőt bölcs nőknek számos példáit találjuk, és talán onnan eredt a főlebbi rága-

lom, hogy a nők tudományos neveltetése nem olly rendszeres mint a férfiaké. Nagyon hirtelen fölfog a nő bármit is, de annak csak felszínét látja, mélyére nem hat le; elvont képzeteket (ideas abstractas) nem képes nagy alkotni mint a férfi; de képzelő tehetsége mégis szörnyen élénk, hamar lángra lobban, hamar is széteszlik, más eszmék által az előbbi mintegy helyéből kiszoríttatván. Erkölcsi tulajdonait a nőknek leginkább ingerlékenységek aránya szerint kell mérnünk; tulzók ők a szerelemben, haragban, gyűlötségben; nők voltak a muzsák, grátiák, de női alakot ruháztak a furriákra is. A babonáság könnyen gyökeret ver a nő kebelben, könnyen megfészkei itt magát a boszszuállás is; a hiúság, tetszvágy, irigység, tettetés, tudnivágyás, rágalmazás, kömyelműség, ingékonyság, akarat gyöngeség stb. a nőknek szinte kitünő jellemeihez tartoznak; — de a szelidség, nyájasság gyöngédség, stb. szinte jellemük fényesb oldalát teszi. —

*A nő természeti jelleme általában.*

A nő egész életműsége mintegy két életre van számolva; nála a nemi működések első a férfinál pedig másodlagos czélra rendelvek, mit a nemző részek helyzete is mutatni látszik. Az emésztő, áthasonlító tehetség sokkal sebesebb, de nem olly erős s nem olly tartós mint a férfinál. A fölszívás (absorbtio) és mint mondám az áthasonlítás náluk sokkal gyorsabb, ezt mutatja testöknek gyorsabb kifejlődése, s az elvesztett részeknek gyorsabb visszapótlása. Ide tartozik a főlebb említett ingerlékenység, ingékonyság. Általában sokban hasonlít a nő egész jelleme a gyermekéhez.

## II. SZAKASZ.

### A nő kortanilag véve.

#### 1. Hó sz á m

A nők nemi életének virága a havi tisztulás, jele és kelléke ez a kifejlett női test egészségének, meunél rendesebben folyik, annál egészségesebb a nő. Több kórok



nazonban e kiűritést sokképen megzavarhatják, késleltethetik, vagy egészen elnyomhatják. E kiűrités a mi égaljunkt alatt a 14-ik — 22-ik évek között szokott beállani. Ennek zavarai az egész életműség egészségére nagyon kártékony befolyással vannak; gyakran a nőt egész éltén át kínzó nyavalyákat hívják létre. Zavar történik pedig az időre — minőség-és mennyiségre nézve. Az időre nézve vagy korán beáll a havitisztulás, vagy nagyon későn kerül elő. A mennyiséget tekintve, vagy fölötte tulzó, vagy nagyon csekély, sőt a rendes előkerülési idő alatt mi sem mutatkozik, hanem egészen el van nyomtatva. A minőségre nézve vagy fájdalmas, nehéz, vegyületében elváltozott vért mutat; vagy nem a rendes, hanem más életmű által választatik el; vagy a vénhedés időszaka (auni climacterici) közeledtével különbféle életmű zavarokat és betegségeket okoz. Mind ezekről röviden értekezendünk. —

*a) A kora havi tisztulás (menstrua praecocia).*

A nemző részekből kifolyó minden vért hőszámi vérek neveznünk nem kell. Hanem minden esetre történnek korai havitisztulások, például az orvosi tár s 1844-ki május 12-én kijött lapjában említve van egy eset, több orvos által (mint valóban különösség) bebizonyított, hogy t. i. egy alig 4 éves kis leánykán rendes havitisztulás mutatkozott; (Ungh megyében) emlői csaknem egészen ki voltak fejlődve, a csecsbimbó nyilván kitűnt, és körtére (area) rendes barnás színű volt, mint az egészen felserdülteknél. Az illy kora havitisztulások többnyire erőműves ingerléseknek, izgatásoknak következménye; de sokat teszen a havitisztulás kora beállására az ülő életmód, az elkényeztetett, puha nevelés, a meleg égalj. A nagyobb rangnak leányain többnyire hamarabb előtűnik ez; valamint a meleg égalj lakóinál is, úgy hogy négerek közt a 9 — 10 éves leány tökéletesen kifejlett, Chinában 11 — 12 éves leányok mind férjhez menendők, midőn ellenben a hideg égalj alatt gyakran a 20 éves leány sem érett. Általában mondhatni, hogy a havitisztulás kora beállása gyöngébb testalkatot és sokkal

erősebb nemi ösztönt feltételez. Némelyek okul hozzák fel a féregkórt (helminthiasis), bőrkütegeket, szerelmes könyvek olvasását. Mint lehet megakadályoztatni ha csak némileg is e kóros változást? — természetesen az indító okok elhárítása által; de ha már egyszer rendes folyást vett, ezt erőszakosan elnyomni nem tanácsos, sőt az elnyomott tisztulást ismét helyre kell állítanunk. Hol az önfertőzés okozta a kóros kifolyást, csak nagy bajjal segíthet az orvos az ezáltal okozott egészségi zavarokon. Azon gyógyindítványok, melyek által e kórt legyőzhetjük, leginkább az életműködés ereje helyreállításában, különösen a nemzőrészek erősítésében áll. Az indokok eltávolítandók, tápláló, de nem ingerlő tápesszközök alkalmazandók, szükséges egyszersemind a léleknek némi szórakozást szerezni. Azonban gyógyszereket is szükség sok esetben alkalmaznunk, ilyenek: a) az erősítők (roborantia), mint a vas, vasas fürdők, pérua héjj stb. b) izgatószer, mint különféle szagos fűvek főzete, szarvas-szarn-lél, hüdös aszat, pézsma, fahéj, léles kenőcsök, fűszeres meleg borogatások, és c) néha szükséges a fölötte nagy ideg gyöngeiséget, érzékenységet lecsillapítanunk, ekkor bódítókat, ideggyöngeiség ellenieket alkalmazunk. d) Ha nagy fájdalomnak jelenkeznek a kereszt tájon, az itt meggyült pangó vér öszvetolulásán néhány nadály által segítünk. e) Ha a vérfolyás nagyon tulzó, fahéjfestvényt, vilsavat, vagy tejfölös timsót stb. és nyugalmat ajánlunk.

*b) A késői havitisztulás (menstruatio serotina)*

Ezen állapot csupán akkor lesz kóros, ha már a test annyira kifejlődött, hogy a tisztulásnak rendes állapotban már jelen kellett volna lenni. Ennek következményei: szorongatlatás, szédülés, bódultság, főfájás, kereszt fájdalom, tagnehézség, has érzékenység, puffadás, és néha fehér folyás; a fentebbiekből ismét más kórok erednek, n. m. a nemesebb életművekrei vértolulás, vérpangás, néha vérömleng az agyban, tüdőben; továbbá ideges bántalmak, nőideg kór (hysteriasis), mindennemű görcsök, szívszorú-

lás, komor kór, örültség, gutaütés, — vagy sáppadt kór, tüdővész, aszkór, vízkór, és más senyvek.

Indokai ennek erőművesek, vagy erőnyiek; gyógyítását az okok különbözősége módosítandja. Az erőműves okokat műtétel-által kell eltávolítanunk, az erőnyieket (caus. dynam) pedig illő szerek alkalmazásával kell megtönnünk; vigyázzunk azonban, hogy főczél ne legyen mindig a tisztulás előhozni akarása, mert néha általános kór miatt marad későre a tisztulás, s e kórt ha meg lábolá a beteg leány, havitisztulása is be fog állani. Néha okul szolgál a vérbőség, az edények telültsége az erős izmos egyénekben; ez esetben a vért kevesbiteni, ritkitani szükséges vérbocsátások, érvágások által; belsőleg oldó középsókat és oldó főzeteket adunk, külsőleg nadályokat s véres köppölyöket rakunk a gátra, a czombok belső oldalára és a szemérem tájra. Ha erőhiány (asthenia) okozza a késői havi tisztulást, mire a beteg sáppadt, gyöngye külleméből, testének alantfoku hőmérsékletéből, a gyöngye, lassu érütésből s a sáppadt kórrai hajlamból következtetünk: itt az erősítő és zsongító szerekhez nyúlunk, millyenek a vas készítményei, a balzsamok stb. — Hol a méh ingerszülte görcei szolgálnak okúl, görcsellenes szerek alkalmazandók. Ha az ingerlékenység, érzékenység tompa: szállékony izgató szereket rendelünk. — Hol féregkór, vagy általános senyvek, mint görvély- és buja kór stb. tartják fel a tisztulást, e kórok ellen irányozzuk gyógmódunkat. Az okokat egyébiránt az orvos mély belátása fogja elősmerni.

*c) Tulzó hószám (metrorrhagia).*

E kórra kell ismernünk, ha a szülőrészekből a rendes havitisztulás ideje alatt a rendesnél több, sőt túlzó mennyiségű vér folyik ki; vagy a tisztulás igen hosszas ideig tart, úgy hogy csaknem ott éri egyik a másikat. — Illyenkor az érütés gyöngye, kihagyó, a test lankadt, a végtagok hidegek; a kedély szomorú, gyakran szívszorulás és ájuldozás áll be, ezeknek szomorú következményeivel egyben. — E kórnak kedveznek mindazon okok, mel-



lyek a vérnek a méhre történő tobulását elősegítik, ilyen a méh gyurmájának s vérereinek petyhüdsége, a méhnek bármí ok általi öszveszorittatása; telhetetlen nemi ösztön s ebből származó örültség (nymphomania); önfertőzés, sülyös vérboulás, vérkoresvegý stb. — A rögtöni sok vérvesztést ájnlás, tetsz- és valódi halál, a hosszas vérvesztést pedig általános elgyöngülés, nőidegkór, senyvekrei hajlam követi. — Gyógymódja palástoló és gyökeres. — Hol vérböség van jelen, és lobos jellem bélyegzi a tulzó vérfolyást, belsőleg lágyító főzeteket rendelünk lobellenes közepsókkal, néha vért is bocsátunk. Ha a méh gyöngesége petyhüdsége tartja föl a tulos vérfolyást, vagy a gyakori szülés, ülő életmód szolgál okul: segélyt hozandnak a keser-fanyar- fűszeres szerek, a kina, fűzal, narancshéjj, japanföld, kinó mézga, fahéj, kénsav; a nagyobb tompaság s gyöngeség erősítő élet- s gyógyrendet kíván. Hol föl van magasztalva az érzékenység, ott görcsellenes szerek szükségesek, így hánytató gyökér, tört adagban, később mákonnyal, és legezélszerűbb a Doverpora. — A palástoló gyógy, a vérfolyás mérséklését tűzi ki czélul, s ez eléretik a legerősb öszvehúzó szerek alkalmazása mellett, ilyen a timsó, fahéj festvény (30 — 50 csöpp egy adagra vízben), hideg borongatások a méh tájára, boros vagy timsóoldatos kérők (turundae), a mellyeket a méhhüvelybe kell betolni; — e mellet főszer a nyugalom, vizirányos fekvés; néha a czombokat erősen be szokták pólyázni.

d) Fölötte csekély havi tisztulás (*menstrua nimis parca.*)

E kórt a kifolyó vér csekély mennyiségén kívül a következő tünetemények jellemzik: szédelgés, fülzúgás, az emlők feszülése, más életművek vérzése, nudor, bőfögés, szívszorulás. E baj a főlebbivel sarkilag ellenkezik, és ha soká tart, magát a méh szerkezetét is annyira elváltoztathatja, hogy többé a tisztulásra képtelen leend. Okai: általános gyöngeség visszatermési erőhiány; a ki nem elégitett nemi ösztön következtében a méhgyurma rostjainak izgatott állapotja; különbféle elfajnlások stb. Ha gyöngeség

van jelen, erősítő szereket adunk, ha pedig elfajulások okozzák a bajt, vagy műtétel által segítünk, vagy a következő s okosan választandó szerekekhez folyamodunk, millyenek: a nadragulya, bürök, szappan, borostyán meggyvíz, dárdanyszerek, kénegek (sulplmreta), higany készítmények stb. s ezeket belsőleg s külsőleg fürdők és fecskendések útján alkalmazzuk.

*e) Hószám fölakadás (menostasia)*

Ezt nem kell összezavarnunk az alább leírt hószám elnyomatással, mellyet különféle kórjelek szoktak követni, és a kettő közti lényeges különbség az, hogy a fölakadás (obstructio menstruum vel menostasia) a hószámnak rendes időre meg nem jelenését, az elnyomás pedig (suppressio) a már folyásnak indult tisztulás hirteleni félben szakadását jelenti. — Néha jele ez a beállt terhességnek is, de hogy a más okok által előhozott a terhességitől megösmérhessük, várakoznunk kell a gyógy mód erősebb nemének alkalmazásával. Okai lehetnek: az általános gyöngeség, s a has zsigerek tömülései; amazon erősítő szerekek segítünk, ezeken pedig oldókkal. Néha okát nem tudjuk kiűzhatolni, 's' ilyenkor az idegbántalmak és senyvek elkerülésére méhvérhajtó (emmenagoga) szereket rendelünk, mellyek vagy odavonók, vagy erőshajtók; az előbbiekhez tartoznak a csipős lábvizek, czombdörzsölés, csörék, nadályok alkalmazása a nemző részekre, véres köp-pölyök s kutacsok a czomb belszinére stb. Erős hajtók (méhvérhajtók, gyermekvesztők) pedig: a sáfrány, kappan-ör, cziczukóró, ammoniak mézga, galban mézga, büdös aszat, myrrha; kénvirág rhenmmal, aloe, fekete linyor, borostyán- és boróka bogyók, léles erős borok, állati illó olaj, minden termény balzsamok, gratiola, terpeninfélék, a tiszafa (taxus baccata) bogyói, szabina boróka stb.

*f.) Hószám elnyomatás (suppressio menstruum)*

A folyásban lévő havi tisztulást gyakran elnyomják: a lelki erős szenvedélyek által okozott ingerek, a nagy megerőtetés, a hirtelen meghűlés, a gyomornak izgató



étkekkel tele tömése, s ennek kövélkeztében heveny lobos bántalom jó létre, loblázzal, vértolulással, sőt némelly nemesebb életművek gynadásával is párosulva; illy esetben nem ritka a méhlob, hashártyalob stb. Gyógymódunkat az okok és tünetények ellen kell intéznünk, a kór természetét s okát is figyelembe véve. A lobos állapotot jegyzi az erős lobláz, erős, gyors, teljes érítés, — s ez ellen helybelileg vagy általánosan alkalmazandó lobellenes szerek használandók. Ha a lobos jellem meg van törve, vagy csak görcsös állapot volna jelen, nagy hasznak a lágyító főzetek beléndek- vonattal, a sáfrány, a hódony (castoreum) szekfűvirág- forrázat, mellyhez egy kis mákony- festvényt is adhatni; külsőleg erős lábfördők, fűszeres borogatások a nemző részekre stb. mint már előadók, nagy haszonnal alkalmaztatnak.

*g) Fájdalmas, nehéz havítisztulás (menstrua dolorifica difficilia.*

Fájdalmas, nehéz havítisztulásnak mondatik az, midőn a hősám erőfogyással, főfájással, fogfájással, bélfájdalmakkal, hányással, sőt hányhasfolyással, (cholera) ájúldozással, rángással, őrültséggel, komorkórral stb. szövetkezve folyik, melly kórjelek néha megelőzik, néha követik a tisztulást. Okul szolgál itt a méhrendszer ingerlése, izgatása; illy inger az önfertőzés szerehni kicsapongás, nőidegkór, a has és méh edényeinek tömült állapotja; féregkór (helminthiasis); vérbőség stb. — E kór az életet keserűvé teszi, magtalanságot is okoz. — A mi gyógyítást illeti, első gyógyjavallat az okoknak elhárítása, ha ekkor sem hagyna alább a baj, igyekezni kell a méhrendszernek helybei és általános görcsrei hajlamát, és gyöngeségét elnyomni; e czélra a rohamok alatt mákonyt adunk fejtelben, — a méh tájra bódító borogatásokat rakunk; meleg félfördőket rendelünk; minthogy pedig kivált vérmeseknél a mákony főfájást okozhatja, e helyett nekik csalmatok vonatát ajánlunk; a rohamok után hosszabb ideig kell adnunk büdös aszatot, vagy káfort, qvassiát, föleresztett ás-

vány savakat, vasat és hideg fürdöket. Az oldósókat tartó melegfürdők is igen hasznosak.

*h) Helyettes havitisztulás (menstrua suppletoria vel vicaria).*

Néha a hószámfolyás hirtelen félbeszakaszlatván, vagy he nem állván, megtörténik, hogy ő más életmű vérzik; például a bélesőn hónaponként rendes idő szerint bizonyos mennyiségű s a hószámnak megfelelő vér ürül ki. Megesik az is, hogy valamely életmű vérhelyett bővebb nedveket választ él, így p. o. történnek a hónap bizonyos idejében bőizzadások, bővebb vizezés stb. — melyek a hószám folyását helyettesítik. A helyettesen vérző életművek vagy hajlandók a vérzésekre szerkezetöknél fogva, így a tüdők, orr, gyomor, egyenes vagy végbél, vagy olyak is vérzenek, melyek különben sértés nélkül vérzeni nem szoktak; így a fül, ajkak, az ujjak hegye, köldök, a kareozott tájak, fekélyek, elnetszett tagok stb. Hogy helyes gyógyjavallatot állítsunk föl, szükséges az okot kifürkészni; ilyen ok a meghűlés, lelkiindulatok; az áthasonlításí erők túlságos volta; a méhrendszer tompa volta, a vénhedési időszak közeledtével; erőműves akadályok; a méhhiány (fölette ritkán), — melly esetekben más kiűritési útát szükség választania a természetnek. — A gyógyításkor csak azon esetben kell hirtelen elállítani a rendellenes kiűritést, hol nagy gyöngeség van jelen; lobos állapot ellen lobellenes módot követünk. Egyéb okokat tekintve is szintén helyes gymómdot fog találni az értelmes orvos (lásd a hószám elnyomatását).

*i) Hószám megszűnés, és következményei.*

A vénhedés közeledtével (nálunk 45—50-dik évben) lassanként megszűnik a havitisztulás, és többnyire sokféle alkalmatlan kórok ennek következményei; így p. o. vértolulás a főre, tüdökre, gyomorra: vérzések az életművekben; nőidegkór, göresök, szívszorulás, bőrvész, köszvény, vérkoresvegyek. — A vértolulások ellen vérboesátást, és lobellenes sókat ajánlunk, az idegkórokat idegesítlapítókkal. föleresztett ásvány savakkal színtetjük: a senyveknek pedig saját — gymómdjuk szerint, és a lábikrára, vagy karra

alkalmazott elvezető kutacsok alkalmazásával igyekszünk elejét venni. — Egyébiránt a jó egészséggel bíró, de már csak nem hószám-vesztett nőknek csak jó életrendet ajánlunk. Hol vértólúlások jelenkeznek, egy évben egyszer kétszer nem fog ártani az érvágás, vagy köppölyözés.

## 2. A terhések nyavalyái.

A terhességet, mint olyat nem kell a betegségek sorába helyezni, de a belőle következhető kórokat annál nagyobb figyelemre kell méltatnunk, minthogy azon kórok kimenetelétől két élet — az anya és magzat élete függ. A terheseken, kivált a kik érzékenyebbek, gyöngébbek, stb. sokszor jönnek elő kóros változások. A méh élete föl lévén magasztalva a terhesség alatt, igen nagy befolyással bír az egész életműség élet folyamára; nagysága által nyomja a szomszéd részeket a hasban, maga a méh is izgataltik viszont. Innen erőműves és erőnyi kórok fejlődhetnek ki, milyenek a főfájás, szédülés, fogfájás, étundor, hányás- hányregedés, epeválasztási zavarok, izzadás hiány, különféle bőrkütegek, szívdobogás, nehéz lélekezés, köhögés, görcsök, vérzések, lelki bajok s zavarok, lábvizdag, láb-visszérdag stb. melyekről ugyan különösen értekezni e lapok kevésre számolt mennyisége nem engedi, csak röviden érintek meg némelyeket.

A tagszaggyatás és fogfájás ellen, ha az egyén vérmes ezélszerű az érvágás, de gyakran a borókával, borostyán kővel vagy rágyantával (mastix) megfűstölt posztóvali dörzsölés legtöbbit ér. Ezenkívül egy kis zacskót kell megtölteni korpával, kevés sóval, vagy székfű- virággal, bodza virág- és káforral, ezt melegen rátenni a fájdalmas tagra, vagy az arcra. Belsőleg hasznos szer a bodza thea.

Az undor, étvágyvesztés, hányás esetében Berstein Gottf. érvágást ajánl; de megjegyzi, hogy ez a gyomor elrontásából is származhatván, ilyenkor középsókat kell rhemmial használni, s utánna szekfűvirág theát inni, citrom savval savanyítva. Minthogy sok terhések a meleg italt ki nem állhatják, a mondottakat hidegen is adhatni.



vagy ezek helyett középső tartalmu vizeket itathatunk velök, Ha nagy hányásrai ösztön van jelen, és az epecsorvának jelei nincsenek, vizes rheum festvényt (tinct. rhei aquos) mákszörppel adhatunk a betegnek; ha pedig epecsorvát találunk, vagy sejdítünk a gyomorban, óránként gyöngé hánytatót adhatunk kanalanként hánytató borkő oldatból (2 szemer 2 obon vízre,  $\frac{1}{2}$  obon mályvaszörppel) míg csak az erőszakos hányás meg nem csöndesül, mi ha megkömnyült, a szert félre tesszük. Néha a hányást az idegek izgatottsága tartja fel; ilyenkor hasznos szer a tiszta borkő kis adagban, vagy egy kis szerecsendió czukorral (Koerber, de nausea et vomitu gravidarum. Götting. 1787).

A köhögést mályva vagy mákszörppel és székfű virág főzettel igyekszünk elállítani.

Görcsök ellen hasznos szer a székfűvirág főzetből csőre, melyhez egy kanál mákolaj, vagy főzött beléndek olaj adatik. Ilyen olajakkal, kenni nagyon czélszerű a göres fogta részeket, ezekhez könleglélt adván. Jót tesznek a meleg és fűszeres lágy borogatások, és a félfördők is, de ez utóbbiak inkább csak szülés előtt alkalmaztassanak.

Gyakran földagadnak a terhes lábai, és visszaérdagok is támadnak a lábakon. Ily esetben sokszor a gyermek nagyon a medencze szélének dőlt — s a terhesnek szokott fekvését meg kell változtatnia, ha azelőtt jobb oldalon feküdt többnyire, s így a gyermek teste is ide hajolt volt: most a baloldali fekvést válassza; gyöngé ha-hajtókat is adni a betegnek, igen czélszerű; azonban a dagadt részeket hideg vízzel kell mosogatni, vagy a szoros polyázáshoz nyúlui. — Ha a daganat a szemérem zajkakon mutatkozik, nem csak nagy fájdalmat okoz a szülés alatt, hanem erős vérzést is hozhat elő. Ez ellen meleg fűszeres borogatásokat kell alkalmaznunk a szülés előtt, vagy szárazon, vagy borban, boreczetben, vagy tejben stb. — vízzel vegyítve főzöttleket; később ezeket félretéve Goulard vizével és káforlélletel kell a daganatot eloszlatni.

A terheseknél keletkező aranyér ellen a csőrék al-

kalimazása s belsőleg középsők (de nem sokszor adva) — jó szolgálatot tesznek. A kereszt tájat hideg vízzel kell mosogatni, valamint az alfelet is; ha arauyeres csomók is vannak jelen, ezekre lágyító és bódár olajakat és kenőcsöket rendelünk.

A terheseket meglepni szokott nehéz vízellés ellen húgyhajtó szereket adni hasztalan, sőt ártalmas is; legjobb pöcsapot alkalmazni, valahányszor szükséges, e mellett gyöngye lágyító nyákos főzeteket adni. Ezeket használhatni akkor is; ha talán véres vizellet állana be. Illyenkor az étrend gyöngye, lobellenes legyen, és a betegnek nagyon ajánlandó a nyugalom, és a vizirányos fekvés.

Az igen érzékeny nők a terhesség első 4—5 hónapjában sok ideges tünetényeket mutatnak, mindig félnek-rettegnek, álmukban is borzasztó képek által kinoztatnak, mindenök fáj, a nélkül hogy valamijök különösen fájna. Az illyek könnyen idő előtt szülnek, s legjobban teszik, ha szabad légen sokat tartózkodnak, némi hozzájok mért — de nem erős testmozgást, és testgyakorlatot visznek véghez, és erősítő szerekekkel élnek, illyen szer a kina, mellynek használatát néha lágyító csőrék és középsők szakasszák félbe. Az illyen ideggyöngye nők gyakran különös vágyat mutatnak valami tárgy iránt, vagy sokszor szokatlan ételeket is kívánnak (malacia et pica).

A terhesség végével, szülés alatt és után egy iszonyú nehéz idegkór (eclampsia gravidarum et parturientium) által lephetnek meg a nők, mellynek rohamai gyakran csak a halállal végződnek be 8—9 vagy kevesebb órák alatt is; gyakran ugyan több időközti engednek egyik rohamtól a másikig. A roham alatt a beteg eszméletét elveszti, feje forró, szeme meredt, látája kitágult, érverése gyors, erős, de görcsös, tagaiban görcsös vonaglások vannak, a lélekezés sebes, kapkodó, hangos, a fogak néha összekocognak, néha állgörcs is van jelen (trismus); a száj szélére nyálhab buborékozik ki stb.

Ezen iszonyú idegkór okai lehetnek: az agyra tóduló



nagyobb vértömeg, vérbőség, a testet összeszorító ruhák; heves lelki indulatok, küllerőszakok, melyek a méhre és hasra hatottak, nagy test mozgás, bő vérfolyások, méh küli terhesség, — a szülők és betegágyasoknál bevett azon rossz szokás, miszerint a bábák is, kivált falun azt állítják, — hogy a beteg-ágyasnak szükség magát borral és pálinkával tele inni, ha ugyan előbbi erejét visszanyerni akarja; okul szolgál még a méhet környező idegfonatnak (mit az újabb időben nyomoztak ki) ingerlése; továbbá a könnyű szülés, midőn a gyermek a méhből kisikolván a szülő részeket csiklándá, és ez annyira felmagasztalja az idegrendszer érzékenységét, hogy annak eselekvősége görcsökben, rángalmakban és nehézkór alakjában jelenkezik, — mint okot tekinthetni még a nehéz szülést is. — A gyógyítás fölötté kétes eredményű; először is érvagással igyekszünk a főről levonni a vért, de ennek rögtöninek kell lenni; a főre hideg borogatásokat rakunk, a végtagokat mustár tésztával borogatjuk be stb. Azonban minthogy e nehéz kórnak gócza (focus) a méh tájra (szülés után) jeges borogatásokat alkalmazhatni, hogy így hideg által eltompítsuk a méhre szolgáló idegek érzékenységét; szinte ajánlanak hideg befeeskendéseket a méhhüvelyen át — sőt Schönlein a betegágyasok nehéz kórában paprika főzetet is fecskend be, inkább a szinte kétes kimenetű gyúladást igyekezvén előhozni, mint hogy a beteg az ideges rohamok alatt meghaljon. Belsőleg ritkán lehet valamiszereteket beadni, minthogy közönségesen áll- és torok-görcs van jelen; — ha a rohamok szűnnek, szűnidőben hasznos szer az édes higany mákonnyal; vagy hánytató gyökér, horgany virág, gyökönke, bűdös aszat. — Ezeken kívül megpróbálhatni a lágy meleg fürdőket is. Mind ezen gyógyszerek mint mondám kétes sikerűek, a baj iszonyúságát tekintvén.

A terhesek körül mi szabályokra kell figyelmeztetni általában? — meglátjuk a következőkben. — Az étel legyen tápláló, nem igen fűszeres; a terhes el ne rontsa gyomrát; szomjúságát vízzel oltsa; ruhája sem

könnyű, sem elnyomó, szoros, nehéz ne legyen; nagy munkákat ne végezzen, magát sem anyagilag, sem szellemileg ne terhelje, ne erőtesse meg; az indulatokat kerülje; az alhas, különösen a nemző részek minden nemű izgatásától, ütéstől stb. óvakodjék; fekvése vízirányos legyen. A gyógyszer alkalmazásakor a magzatot is tekintetbe kell venni, nehogy időtlen szülés következzen. A csikaró erős hashajtók, az aloe a többek közt, — továbbá a szénegek, a vasas vizek, hidegfördők stb. nagy vigyázattal használtassanak; a has azonban a csorvától szabadon tartassék, a szóval terhest minden kül, és belső káros befolyástól őrizni kell.

### 3. A szülők és betegágyasok nyavalyái.

Szülés alatt a nő igen nagy életveszedelem közt van, mellyeket ugyan csaknem mindenkor le bír győzni a természet hatalmas életerejé. Szülés alatt a szülőrészek megváltozván, ingerelvék, néha meg is sértetnek; sokszor vérzések állanak be, vagy különbféle lobokra tétetik a nő hajlandóvá. — A szülő egészségét föltételező természeti jótekonny bírálata a gyermekágyi tisztulás, és a tejelválasztás. — Minthogy a terhesség s maga a szülés is inkább életani, mint kórtani tárgyak; a betegágyas körüli minden orvosi munkálataink a következőkben határozódnak: — az első 24 óra alatt szorgalmasan kell vigyáznunk, nem áll-e be méhvérvzés; a kisdetet néhány órák múlva az emlőkre kell tenni; a betegágyas 10—14 nap ágyban fekvén vigyázzon, nehogy meghűljön; kerülje az indulatoskodást; gyomrát megne terhelje, szeszes italoktól őrizkedjék; ha csorvás állapot van jelen, ezt a bélcsőből himboly olajjal legcélszerűbben üríthetni ki. Egyébiránt kórjeli gyógymodot kövessen az orvos. Az idetartozó különös betegségek:

#### a) A gyermek ágyi láz.

Sokan a gyermekágyast meglepő bármilly lázat gyermekágyi láznak (febris puerperalis) keresztelték el, mi ugyan nem állhat, minthogy különbféle lázaktól meglepethetik a gyermekágyas, és e láz külön kór a gyermekágyasban (feb-

ris in puerpera). — Kórjelei a gyermekágyiláznak; a has fájdalmasan fölpuffadt, úgyhogy néha a takaró súlyát sem szenvedheti; erőhanyatlás, igen gyors érítés; a tisztulás és tejelválasztás kimarad; étvágy- hiány; kiállhatlan szomj; hányás, erőtetés stb.— E betegsége 2—12-dik napján kezdődik a gyermekágyasnak, és 4—5 nap alatt halállal végződik, vagy ha e szomorú kimenetel mindjárt be nem állana is, ritkán lábbad fel a beteg; rendszerint áttételek törtennek nemesebb életművekre, például az agyra, köles kútegek borítják el a beteget; a tej tályogokat képez; az emlők meggyuladnak és tályogok képlődnek bennök; gyakran vízkór is fejlődik ki. — A kórbonczolatkor a hashártyát, beleket, és méhet gyúladt állapotban találjuk, s nagy mennyiségű tejhez hasonló kiizzadmányt lelünk.

E kórt előhozzák különös hajlam mellett: a lelki indulatok; meghűlés, étrend elleni hibák; erős hashajtók; nehéz szülés; erőműves sértések stb.; — lényegét teszi pedig a lobos állapot. Gyakran járványilag uralkodik, s ilyenkor ragályos jellemet ölt kivált a szülőházakban; valódi okát ugyan ki nem magyarázhatjuk.

A gyermekági láz részint előleges gyógyítást kíván, részint a már kifejlődöttnek megtörését kell czélul tűznünk. Azért is a terhesség végével sokszor járjon a terhes szabad légen, minden ártalmas befolyásokat kerülván, hogy a mennyire lehető, a legegészségesebb terhes állapotban tartsa meg magát. Ha nagyon vérmes, kevésel szülés előtt eret kell rajta vágatni. — Midőn a láz kiütött, melynek jelleme lobos: lobellenes hashajtókat kell belsőleg adnunk. Ha a tejelválasztás megszűnt, ezt az emlőkre rakott szívó köppölyökkel, meleg borogatásokkal kell előhívnnunk. A betegági tisztulás elmaradtával pedig belsőleg pórist adunk, a nemző részekre nadályokat rakunk, és a méhhüvelybe lágyító fecskendéseket teszünk, vagy a mi még jobb: a nemző részekre meleg borogatásokat rakunk; a hányásrai ösztönt hánytató gyökér porral igyekszünk legyőzni. Ha a lobos állapot nagy fokot mutat; érvágás, nadályok, és véres



köppölyök ajánlatnak; belsőleg a fájdalom enyhítésére borostyánnmegyviz, gyökönke és más illy idegre ható szerek, vagy édeshiganyal vegyített mákony, jó szolgálatot tesznek. A kiizzadmány ellen belsőleg édes higany, külsőleg káforos lél és higany-kenőcs bekenése hasznos. Ha ideges tünetmények mutatkoznak: gyökönkét, kappanórt, pézsmát adunk; — midőn a láz rothasztó jellemet ölt: kina, káfor, vilsav, kénsav segíthetnek. —

b) *A betegágyas fehér tompordagja. (Leucophlegmasia dolens puerperalis).*

Ez hirtelen támadott daganat a tomporon, mely a csip-tájrról a czombokra, és sokszor a nemző részekre is elterjed; igen erős lázzal lép fel; a beteg ágy 6—14 napján támad, 8—14 nap alatt alkalmas segítség hiányában halállal végződik. — A betegágyi lázzal rokonos kór; előhoztik a medencze nyirkedényeinek a terhesség alatti nyomás következtében kifejtett gyulladás a s bőven kiválasztot nyírknek a sejtszövetbe lett átszűrődése által; más okai azok, mellyek a betegágyi lázéi. — A gyógyjavallat itt a gyulladás megtörését, és a kiizzadmány, vagy átszűrődött nyírk fölszivódását tűzi ki főczél gyanánt. Az első megtörténik vérbochtás, lobellenes sók, és piros gyűszűvirág használata mellett; a másodikat higanyos kenőcs, oszlató száraz borogatások viszik véghez; vagy ha a tályog teljesen kifejtett, föl kell nyitni azt, és a nedvességet kiürítván, a gyógyulást bevárni. —

#### 4. Tejözön (Calactirrhoea).

Ha a tej iszonyú mennyiségben választatik el, a betegágyas egészségét lerontja, minthogy az áthasonlítás és tápkészítés folyamát megzavarja; erőhiányt, reszketést, görcsöket, tüdővést, aszkórt, vízkórt stb. — vagy halált is okozhat.

Okai: a sok szoptatás, vagy több gyermek szoptatása ugyan akkor; a havitisztulás elmaradása; leverő lelkiindulatok. — Hol nagy az ingerlékenység, lobellenes rendszabály, széksó, tiszta borkő, Haller sava, lobellenes hasznaj-

tók szükségesek, — ha nagy gyöngeség állott be, föl kell hagyni a szoptatással, és tápláló étés, keserű erősítő szerek, kína, izlandi zuzmó, vas stb. hoznak kívánt segílyt.

### 5. Magtalanság (sterilitas).

Magtalanságnak nevezzük azon rendellenes női állapotot, midőn a nő természetileg képtelen a fogamzásra, vagy midőn erőműves akadályai vannak a közösülésnek, és a fogamzásnak. Okai tehát a magtalanságnak: a méhüvelyzár (atresia vaginae), a méhüvely görcsös összehúzódása vagy kitömülése; a méh életművi hibái, összenövése, kőkem; pöfeteg; hószám- hiány, bő havitisztulás, fehér folyás, lelki ingulatok, rossz táplálát, ingerhiány; hideg vérmérséklet; nagy érzékenység, melly a nőtülés alatt görcsökből tör ki; gyakori vagy erőszakos közösülés; — ide tartozik az is, ha a nő és férfi közt illő erőnyi viszony nincsen (proportio dynam). vagy ha a nő bizonyos korcsvegyben és senyvben szenved. — A gyógymódot illetőleg először az okokat kell elhárítani; továbbá pedig a nemző részeket erősíteni, zsongítani. E célból jó szerek: a vas készítményi vasas meleg fürdők, vagy hideg és tenger fürdők.

### 6. Fehér folyás.

A fehérfolyás olyan kór, midőn az asszonyi nemzőrészek takonyhártyája minden buja senyv nélkül mennyiségére s minőségére nézve rendetlen fehér, sárgás, sőt zöldes sárga, sűrű vagy vékony, néha csipős bűdös nyálkát önt ki a méhüvelyen át. — Ennek szörnyű következményei lehetnek, ha gyógyítása elmulasztatik, így erőtlenség, étvágyvesztés, nehéz lélekzés, nőidegkor, aszláz, gnyladás, elfajulások. —

A kórismét tekintve figyelniünk kell, nincs-e jelen méhkőkem (scirrhus uteri), melly okánl s okozatánl is szolgálhat a fehérfolyásnak; ennek kórjelei: szűrő, égető, szaggató fájdalom a medenczében, bűdös kifolyás, elnyomott, vagy túlos tisztulás, senyves külem, — bizonyossá teszen pedig a vizsgálás.



Okai a fehérfolyásnak: az ülő életmód, nagyon tápláló ételek, meleg italok, nedves lég és lakás; meghűlés; a nemző részeknek kohos, vagy izzó szén általi melengetése a nemi ösztönek képzelgések általi ingerlése, önfertőzés; gyakori nőszülés; huratos, csúzos, bőrküteges, görvélyes áttételek; aranyér- s hószám elnyomása, kökem, pöfetegek a méhben stb. A gyógyítást illetőleg, az okokat szükség elhárítanunk; eleintén a lobos állapot ellen dolgozunk helybeli vérbocsátások, lágyító főzetek, sziksó, szalamia só stb. által; hol már erőhiány fejlett ki, hasznos a test hideg vízzeli mosogatása, belsőleg erősítők; kopai balsam, a gyantás mézgák, összehúzó szerek, mint a rataunhia, kíná, timsó, kén-savas vaséleg, vasas vizek; — külsőleg: tisztaság s fecskendések ajánlandók, e célra jó szerek: a cserfa, fűz- és diófa héjj és level főzetek; kina s bőrök főzet édes hígannyal, horggáliczczal, timsóval, pokolkővel, összehúzó erősítő fürdők.

J e g y z é s. A nők nemző részeinek, emlőinek gyulladásairól, ezeknek számtalan következményeiről, s a nőidegenkórról (hysteriasis) stb. szóllanom az értekezés korlátoltsága nem engedi.

## Theses defendendae.

1. Forcipis in parturientibus cauta ac crebrior applicatio melior, quam ejusdem pro casibus gravissimis reservatio.
2. Cephalotribe non in omnibus, sed in plerisque casibus (ubi caput diminuendum) perforatorio praeferenda.
3. Medicus aeger, pessimus aeger.
4. Plessimeter et tubus Laenecii sunt arma medico diagnosim molienti inevitabilia.
5. Male curat morbos exanthematicos, qui cutim solam respicit.
6. Nulla operatio tantam requirit solertiam, atque experientiam, quam herniotomia.
7. Naturam domi noscere plus utilitatis adfert Patriae, quam si illam terrarum scrutamur exterarum.
8. Prognosim medicus non ductu animi, sed intellectu et conscientia statuere debet.